

作成年月 2006年8月

改訂年月 2017年7月

使用説明書

動物用医薬品

使用基準 指定医薬品

ご使用前に必ず本使用説明書を良く読み、内容を理解した上で使用して下さい。
また、本使用説明書を必要ときに参照できるように大切に保管して下さい。

散剤

水産用アンピシリン200「リケン」

〔本質〕

本剤は、合成ペニシリンの一種のアンピシリンの散剤でグラム陽性菌、グラム陰性球菌、レプトスピラばかりでなく、グラム陰性桿菌にも作用し、細菌の細胞壁合成阻害を一次作用点として殺菌的に奏効します。

水産用アンピシリン200「リケン」は、水産用のアンピシリン製剤として梅雨期に多発する類結節症（パスツレラ・ピシシーダ菌）に速やかに極めて有効に作用します。経口投与による体内吸収は非常に速やかで、症状の進行の速いスズキ目魚類の類結節症には優れた専用対策用薬剤です。

本品100g中

【成分及び分量】

日局アンピシリン……………20g（力価）

【効能又は効果】

アンピシリン感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。
スズキ目魚類：類結節症

【用法・用量】

魚体重1kg当たり、1日量として本剤0.025～0.1g（アンピシリンとして5～20mg（力価））を配合飼料等に混合したのち、餌料に均一に混ぜて、5日間連続投与する。

【使用上の注意】

（一般的注意）

1. 本剤は効能・効果に定められた適応症の治療にのみ使用すること。
2. 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与はさけること。
3. 本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
4. 本剤を対象魚種に投与する場合は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。
5. 本剤は水産試験場等の指導機関に相談の上使用すること。

【使用者に対する注意】

1. 使用者はその取扱いに際してマスク、メガネ、手袋等を用いて、吸入及び目や皮膚に付着しないよう注意し、慎重に使用すること。
2. 使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいすること。

【対象動物に対する注意】

〔適用上の注意〕

1. アンピシリンはペニシリナーゼ産生菌には通常奏効しないので、この場合は他の薬剤を使用すること。

【取扱い上の注意】

1. 本剤の必要量をミンチに混ぜるか、練り餌によく混ぜて与えること。
2. 開封後は速やかに使用すること。

【 保管上の注意 】

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

注意：本剤は薬機法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品ですので、スズキ目魚類について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。
スズキ目魚類：食用に供するために水揚げする前5日間

【 貯蔵方法 】

気密容器

【 有効期間 】

36ヵ月（外装に表示）

【 包装規格 】

10kg（1kg×10）

[問い合わせ先]

〒332-0011

埼玉県川口市元郷4-1-8

リケンベッツファーマ株式会社

TEL:048-224-8451

FAX:048-224-1079

Eメール:riken@r-vets.jp

製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社
埼玉県川口市元郷4-1-8