

貯法	室温保存、気密容器
----	-----------

動物用医薬品

スズキ目魚類の寄生虫（ハダムシ）駆除剤

使用基準

水産用プラジガード・フレーバー

承認指令書番号	30動薬第3443号-1
販売開始	2020年11月

本品は魚のストレスとなる淡水処理や薬浴処理の代わりとなる、経口剤の寄生虫駆除剤です。嗜好性の高い素材を配合しているため、魚への投与が簡単です。

本品の有効成分であるプラジクアンテルは、投与後、速やかに魚の体内に吸収され、体表粘液において寄生虫の吸着能を阻害することにより、虫体が魚から脱落します。

【成分及び分量】

本品100g中

有効成分	含量
プラジクアンテル	50g

【効能又は効果】

スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ (*Benedenia seriolae*) の駆除

【用法及び用量】

魚体重1kg当たり1日量プラジクアンテルとして下記の量を、水産用展着剤もしくは展着剤を含有した養魚用配合飼料と混合した後、餌料中に均一となるように添加し、1日1回、3日間経口投与する。

スズキ目魚類の体表に寄生する

ハダムシ (*Benedenia seriolae*) の駆除：150mg

【使用上の注意】

(基本的事項)

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は、スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ (*Benedenia seriolae*) を駆除するために使用し、スズキ目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。
- 本剤は、正しく使用しなければハダムシ (*Benedenia seriolae*) の駆除効果が得られないおそれがあるので、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。
- 本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(スズキ目魚類)について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

スズキ目魚類：食用に供するために水揚げする前10日間

- 本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。

(使用者に対する注意)

- 本剤の取扱い時には粉じんを立てないようにし、必要に応じて防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他には流用又は転用しないこと。
- 本剤を数回に分けて使用する場合には、すみやかに使用すること。
- 本剤は、食品、食器、飼料等と区別し、小児の手の届かないところに保管すること。
- 直射日光を避けて保管すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 本剤を取扱った後には手及び顔を石鹸で洗浄すること。

(魚に関する注意)

- 期待する駆除効果が得られないことや思わぬ副作用が発生するおそれがあるので、本剤には、他の薬剤を加えて使用しないこと。

【製品情報お問い合わせ先】

リケンベッツファーマ株式会社 梅田工場
〒123-0851 東京都足立区梅田1-29-12
TEL：03-5888-6044
FAX：03-5888-6045

製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社

埼玉県入間郡越生町成瀬829-6

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。