

やっぱり国産

動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

アンピナトリウム注

ペニシリン系抗生物質製剤 本品1バイアル中アンピシリンナトリウム5g(力価)



製造販売業者



リケンベッツファーマ株式会社
埼玉県入間郡越生町成瀬829-6

[製品情報・お問い合わせ先]
メール: riken@r-vets.jp
電話: 03-5888-6044

動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

アンピナトリウム注

ペニシリン系抗生物質製剤 本品1バイアル中アンピシリンナトリウム5g(力価)



投薬早見表

* 8 mg (力価) / k g で計算、1 バイアルあたり 2.5 mL に溶解

体重	推奨投与量*
50 kg	2 mL
100 kg	4 mL
350 kg	14 mL
625 kg	25 mL

【成分及び分量】本品1バイアル中アンピシリンナトリウム…5g(力価)

【効能又は効果】

有効菌種: 本剤感性ブドウ球菌、レンサ球菌、コリネバクテリウム、大腸菌、サルモネラ、パストレラ

適応症 牛: 肺炎、乳房炎、産褥熱

【用法及び用量】

用時、日局注射用水又は日局生理食塩液を用い、1g(力価)当たり5mLに溶解する。

1日1回、牛の体重1kg当たりアンピシリンとして下記の量を静脈内に注射する。

牛: 肺炎、乳房炎4～8mg(力価)、産褥熱6～8mg(力価)

【使用禁止期間】

牛: 食用に供するためにと殺する前3日間又は食用に供するために搾乳する前72時間

〔牛〕ペニシリン系抗生物質比較表



	動物用医薬品 要指示 指定 使用基準 アンピナトリウム注 	動物用医薬品 要指示 指定 使用基準 動物用懸濁水性 プロカインペニシリン G 	動物用医薬品 要指示 指定 使用基準 マイシリン・ゾル 	動物用医薬品 要指示 指定 使用基準 アンピシリンゾル 20% 注
肺炎	○	○	○	○
乳房炎	○	○	○	
産褥熱	○			
気管支炎			○	○
放線菌症		○	○	
細菌性関節炎			○	
気腫疽		○		
細菌性下痢症				○
術後感染症の予防		○	○	
使用禁止期間	と殺前3日 搾乳前72時間	と殺前14日 搾乳前96時間	と殺前90日 搾乳前96時間	と殺前49日 (生後6月を超えるものを除く)