

# Florfenicol 40 RIKEN for Fish

| 動物用医薬品 | 指定 | 使用基準 |

すずき目及びうなぎ目魚類の抗菌剤

# 水産用 フロルフェニコール 40「リケン」

#### 【効能又は効果】

フロルフェニコール感受性菌に起因する 下記疾病魚類の死亡率の低下。

すずき目魚類:類結節症、連鎖球菌症

うなぎ目魚類:パラコロ病

#### 【用法及び用量】

1 日魚体重 1kg 当たり本剤を下記の量を 飼料に添加し、5 日間投与する。

すずき目魚類、うなぎ目魚類: 0.25 g





# 幅広い抗菌力

合成抗菌剤フロルフェニコールは、広範囲のグラム陽性細菌及びグラム陰性細菌に対して抗菌力を示します。 合成ペニシリン、オキソリン酸、オキシテトラサイクリン、チアンフェニコールに対する耐性菌にも 強い抗菌力を発揮します<sup>1)</sup>。

# 短い使用禁止期間

フロルフェニコールは脂溶性が高く、組織移行性が 良好であるため<sup>2)</sup>、各組織に広く分布します。休薬後の 各組織からの消失も速やかなため、使用禁止期間が短 いのが特長です。(すずき目:5日間、うなぎ目:7日間)

- Lashev L, Haritova A: Comparative allometric analysis of pharmacokinetics of flor fenicol and tiamphenicol, Bulgarian Jour nal of Veterinary Medicine, 9,115-122 (2006)
- Schwarz S, Kehrenberg C, Doublet B, Cloeckaert A: Molecular basis of bacterial resistance to chloramphenicol and flor fenicol, FEMS Microbiol Rev. 28,519-542 (2004)

#### 劇 動物用医薬品 指定 使用基準 すずき日及びうなぎ日魚類の抗菌剤

# 水産用 フロルフェニコール 40「リケン」

【成分及び分量】本品 100 g中 フロルフェニコール … 4.0g

#### 【効能又は効果】

フロルフェニコール感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。

すずき目魚類:類結節症、連鎖球菌症

うなぎ目魚類:パラコロ病

#### 【用法及び用量】

1日魚体重1kg当たり本剤を下記の量を飼料に添加し、5日間投与する。

すずき目魚類、うなぎ目魚類: 0.25g (フロルフェニコールとして10 mg)

#### 【貯法】

遮光して気密保存

#### 【使用上の注意】

#### (基本的事項)

#### 1.守らなければならないこと

#### (一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用 すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 なお、用法・用量に 定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避 けること。
- ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の投与に いめること。
- ・本剤は、指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産 試験場等)に相談の上使用すること。
- ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意:本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83錠の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(すずき目、うなぎ目魚類)について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前5日間 うなぎ目魚類:食用に供するために水揚げする前7日間

#### (使用者に対する注意)

・本剤を使用する際は、防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用し、 粉じん等の吸入及び眼や皮膚に付着しないように注意すること。

#### (取扱い及び廃棄のための注意)

- ・本剤は小児の手の届かない所に保管すること。
- ・本剤は直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。
- ・本剤の必要量をミンチに混ぜるか、練餌によく混ぜて与えること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れ替えないこと。
- ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分する
- ・本剤を廃棄する際には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方 公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

#### 2.使用に際して気を付けること

#### (使用者に対する注意)

- ・誤って本剤を飲みこんだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用後、または本剤が使用者の皮膚に付着したときは、石けん 等でよく洗い、水で十分うがいをすること。

#### (取扱い上の注意)

・開封後は速やかに使用すること。

#### 【製品情報お問い合わせ先】

リケンベッツファーマ株式会社 梅田工場 TEL 03-5888-6044


# リケンベッツファーマの水産薬ラインナップ

リケンベッツファーマでは、従来品にはない高い嗜好性を追求し、投薬ロスが少なく、漁場にやさしい製品の開発を行っております。

利便性の高い製品開発を行い、さらに水産業界の発展に貢献してまいります。

動物用医薬品「使用基準」

水産用 プ**ラジガード・フ**レーバー









▲ すずき目魚類の寄生虫 (ハダムシ) 駆除剤

動物用医薬品 指定 使用基準

# 水産用エリスロ200「リケン」



▲ すずき目魚類の抗菌剤

動物用医薬品 指定 使用基準 すずき目 無類の抗菌剤

### 水産用 アンピシリン200「リケン」

動物用医薬品 指定 使用基準

すずき目魚類の抗菌剤

## 水産用 OTC-Q200「リケン」

動物用医薬品 指定 使用基準

すずき目魚類の抗菌剤

水産用 オキソリン酸懸濁液 SO「リケン」

劇動物用医薬品指定使用基準

すずき目魚類の抗菌剤

水産用 チアンフェニコール200 「リケン」