

効能追加!

牛の急性乳房炎に伴う

臨床症状の軽減。

動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

劇

メロキシカム2%注

牛用非ステロイド系消炎鎮痛剤

MELOXICAM

2% injection



50mL

point

1

開けやすいパッケージ

利便性を追求し、ワンタッチでパッケージを開けられるようにしました。

point

2

簡単な単回投与

投与は1回の皮下注射のため、牛への治療回数が少なく、ストレスを軽減できます。

point

3

有効性と安全性

メロキシカムは選択的にCOX-2を阻害して優れた抗炎症作用を示すと共に、消化管障害、腎毒性等の副作用が少ない安全性の高い成分です。

point

1



【製品情報お問い合わせ先】 共立製薬株式会社 学術 〒102-0073 東京都千代田区九段北一丁目11番5号 TEL:03-3264-7559

販売元



共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-6-5

製造販売業者



リケンバツツファーマ株式会社
埼玉県入間郡越生町成瀬829-6

開発元



獣医医療開発株式会社

製品概要



MELOXICAM
2% injection

【用法及び用量】

牛：体重1kg当たりメロキシカムとして0.5mgを皮下に単回注射する。

牛の体重(kg)	投与量(mL)	メロキシカム(mg)
100	2.5	50
200	5.0	100
300	7.5	150
400	10.0	200
500	12.5	250
600	15.0	300

【貯法】 室温保存、密封容器

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

メロキシカムはオキシカム系の非ステロイド系消炎鎮痛剤である。炎症性反応を引き起こすプロスタグランジンの合成を誘導するシクロオキシゲナーゼ(COX-2)を阻害することにより消炎鎮痛効果を発揮するが、従来の非ステロイド系消炎鎮痛剤に見られるような消化管障害、腎毒性等の副作用の発現が少ないという特徴を持つ。

動物用医薬品 要指示 指定 使用基準

劇 メロキシカム2%注


牛用非ステロイド系消炎鎮痛剤

【成分及び分量】 本品1mL中

有効成分	含量
メロキシカム	20mg

【効能又は効果】

牛の急性及び亜急性細菌性肺炎に伴う臨床症状の軽減。
子牛の感染性の急性下痢症に伴う臨床症状（活力、食欲、糞便性状、脱水及び体温）の軽減。ただし、補液を要しない程度の症例に限る。
牛の急性乳房炎に伴う臨床症状の軽減。



メロキシカム2%注と標準剤(先発品)を、健康な牛(n=16)に単回皮下注射して血中メロキシカム濃度を測定し、得られた薬物動態パラメーターについて統計解析を行った結果、両剤剤の生物学的同等性が確認された。



1



3



5



安心・安全の国内製造

症状発現

治療

症状軽減


2

牛にメロキシカム2%注を単回皮下注射する。同時に、病原体や症状への適切な治療を実施する。



4

発熱が改善される。



メロキシカム2%注は
単回の皮下注射で、
速やかに、かつ持続的に
臨床症状を軽減します。